

2.2.1.2. Sertificētie vaislas buļļi

N.p. k.	Slimība	Diagnostiskie izmeklējumi			Specifiskā profilakse	Pamatojums
		Biežums, apjoms	Izmeklējamā substance	Metode		
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Tuberkuloze</b> <i>/Tuberculosis/</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku	Āda kakla apvidū	<b>Alerģiska</b> - tuberkulīna tests (zīdītāju tuberkulīns)	Specifiskās profilakses nav	MK noteikumi Nr.529 (27.06.2006.) IX nodaļa
2.	<b>Bruceloze</b> <i>/Brucellosis/</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku	Asins serums	<b>Seroloģiska</b> - RBR	Vakcinācija aizliegta	
3.	<b>Govju enzootiskā leikoze</b> <i>/Leucosis enzootica boum/</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku	Asins serums	<b>Seroloģiska</b> - ELISA	Specifiskās profilakses nav	
4.	<b>Infekciozais rinotraheīts- pustulozais vulvovaginīts (IRT-PVV)</b> <i>/Rhinotracheitis infectiosa boum-vulvovaginitis pustulosa/</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku, kuri nav profilaktiski vakcinēti	Asins serums	<b>Seroloģiska</b> - ELISA	Vakcinācija ar marķētu vakcīnu	
5.	<b>Trihomonoze</b> <i>/Trichomonosis/</i>  <i>Prasība nav obligāta sertificētiem vaislas buļļiem, kurus izmanto dabīgai lecināšanai tikai savā ganāmpulkā</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku (spermas iegūšanas periodā un/vai kuri ir kontaktā ar buļļiem, no kuriem savāc spermu. Buļļi, pēc atpūtas perioda, kas garāks par 6 mēnešiem jāpārbauda 30 dienu laikā pirms plānotās spermas savākšanas uzsākšanas)	Prepūcija gļotas vai sekrēts, sperma	<b>Mikrobioloģiska</b>	Specifiskās profilakses nav	MK noteikumi Nr. 880 (15.11.2011.) 24. <sup>4</sup> punkts
6.	<b>Govju virusālā diareja</b> <i>/Bovine virus diarrhoea/</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku	Asins serums antivielu noteikšanai vai EDTA asinis antigēna noteikšanai	<b>Pēc izvēles ar vienu no metodēm:</b> 1.) seroloģiski – IFA, nosakot antivielas. Ja bullis ir seropozitīvs, pārbauda uz vīrusa klātbūtni; 2.) virusoloģiski - ELISA, nosakot vīrusa klātbūtni (antigēnu). <b>Profilaktiski vakcinētiem buļļiem</b> – tikai virusoloģiski, nosakot antigēnu.	Mākslīgās apsēklošanas staciju un punktu dzīvniekiem profilaktiskā vakcinācija aizliegta	
7.	<b>Kampilobakterioze<sup>4</sup></b> <i>/Campylobacteriosis/</i> <i>(ierosinātājs - Campylobacter fetus subsp. venerealis)</i>	1 x gadā, 100% dzīvnieku, kas vecāki par 12 mēnešiem un tiek turēti dabīgai govju lecināšanai  2 x gadā, 100% dzīvnieku, kas vecāki par 12 mēnešiem un atrodas mākslīgās apsēklošanas stacijās (izmeklējot trīs reizes ar 10 dienu intervālu)	Prepūcija gļotas vai sekrēts, sperma	<b>Mikrobioloģiska</b>	Specifiskās profilakses nav	MK noteikumi Nr.507 (24.07.2012.) II nodaļa